



**Инструкция по медицинскому применению  
лекарственного средства**

**ТЕРАФЛЕКС® ХОНДРОКРЕМ ФОРТЕ**



**Наименование**

Терафлекс® Хондрокрем Форте, крем для наружного применения (10 мг+50 мг)/г.

**Описание**

Крем от светло-желтого с зеленоватым оттенком до желтого с зеленоватым оттенком цвета с запахом диметилсульфоксида.

**Фармакотерапевтическая группа**

Прочие средства для наружного применения при болях в суставах и мышцах. Код АТС: M02AX10.

**Состав**

1 г крема содержит

действующие вещества: хондроитина сульфат натрия 50 мг, мелоксикам 10 мг;  
вспомогательные вещества: диметилсульфоксид, пропиленгликоль, макрогола цетостеарат, цетостеариловый спирт (цетиловый спирт не более 60%, стеариловый спирт не менее 40%), парафин жидкий, вазелин, имидомочевина, натрия дисульфит, вода очищенная.

**Фармакологические свойства**

Терафлекс Хондрокрем Форте крем обладает комбинированным действием: оказывает обезболивающее действие, способствует увеличению объема движения суставов (в области нанесения крема), обладает противовоспалительным действием, уменьшает припухлость суставов. Благодаря оптимальному сочетанию компонентов крема отмечается взаимное усиление их обезболивающего и противовоспалительного эффектов.

Хондроитина сульфат натрия – высокомолекулярный мукополисахарид, который является естественным компонентом хрящевой ткани. Хондроитина сульфат натрия ингибирует ферменты, вызывающие поражение хрящевой ткани, тормозит процессы дегенерации (разрушения) хрящевой ткани, стимулирует синтез гликозаминогликанов, тем самым уменьшает боль в суставах и улучшает их подвижность.

Мелоксикам – нестероидное противовоспалительное средство, обладает противовоспалительным, анальгетическим действием. Мелоксикам избирательно ингибирует циклооксигеназу 2, нарушает метаболизм арахидоновой кислоты, уменьшает в очаге воспаления количество простагландинов (медиаторов боли и воспаления). Мелоксикам является хондронейтральным препаратом, не оказывает негативного влияния на хрящевую ткань, не влияет на синтез протеогликана хондроцитами суставного хряща.

**Фармакокинетика**

Фармакокинетика компонентов препарата не изучалась.

## **Показания к применению**

В составе комплексной терапии остеоартроза коленного сустава.



## **Способ применения и дозы**

Наружно. Слегка втирают полоску крема длиной от 1 до 5 см, кратность применения – 2-3 раза в сутки. Необходимое количество препарата зависит от размера болезненной зоны. После нанесения крема руки необходимо тщательно вымыть. Длительность лечения зависит от показаний и отмечаемого эффекта.

## **Побочное действие**

*Со стороны кожи и подкожных тканей возможны:* гиперемия, папулезно-везикулезные высыпания, шелушение, фотосенсибилизация, аллергические реакции (зуд и жжение кожи, многоформная эритема, крапивница).

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата (а также к другим нестероидным противовоспалительным средствам); полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других НПВС (в т.ч. в анамнезе); нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения, детский возраст до 12 лет, период беременности и лактации.

## **Передозировка**

Крайне низкая системная абсорбция действующих веществ при наружном применении делает передозировку практически невозможной.

## **Меры предосторожности**

Крем следует наносить только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. Не следует допускать попадания в глаза и слизистые оболочки.

Следует проконсультироваться с врачом перед совместным применением Терафлекс Хондрокрем Форте крема с другими НПВС, а также при необходимости использования препарата более 2-х недель.

Следует соблюдать осторожность при нарушении функции почек и печени, хронической сердечной недостаточности, при выраженной патологии желудочно-кишечного тракта (кровотечения желудка и 12-перстной кишки, язвенная болезнь в фазе обострения или тяжелые нарушения свертываемости крови), пожилой возраст.

В период лечения возможно развитие реакций фоточувствительности. Для уменьшения риска развития фотосенсибилизации пациентам следует избегать УФ-облучения и посещения солярия.

Входящие в состав вспомогательных веществ диметилсульфоксид и пропиленгликоль могут раздражать кожу; цетостеариловый спирт может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

## **Беременность и лактация**

Применение препарата противопоказано в период беременности и лактации.

## **Влияние на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами**

Не влияет.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

## **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Форма выпуска**

Туба алюминиевая 30 г вместе с листком-вкладышем помещены в картонную коробку.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Название фирмы-заявителя/производителя, адрес:**

Байер Консьюмер Кэр АГ,  
Петер Мериан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцария

АО «Нижфарм»,  
ул. Салганская, 7, Нижний Новгород, 603950, Россия